



بیمارستان آیت... طالقانی

آبسه ی دندان

شماره سند: PF-JW-04

نوبت بازنگری: اول

تاریخ ابلاغ: ۹۸/۰۸/۲۵



آبسه ی دندان

آبسه و عفونت علل مختلفی دارد که در ناحیه ی دهان و فک و صورت، یکی از علل شایع علت دندانانی است که به دنبال پوسیدگی دندان و عدم درمان آن، میکروبیها به مغز دندان (پالپ دندان) وارد می شوند و باعث ایجاد التهاب در پالپ شده و این التهاب باعث افزایش حجم پالپ می شود. با توجه به اینکه پالپ دندان در یک محفظه ی بسته واقع شده است، این افزایش حجم باعث افزایش شدید فشار داخلی آن شده و درد دندان شروع می شود. به تدریج با گسترش التهاب و عفونت به بافت های اطراف دندان، آبسه ی دندانانی شکل میگیرد. در صورت درمان نشدن به موقع آبسه ی دندان، به تدریج فضاهای عمقی مانند فضاهای اطراف حلق و مجاری تنفسی و حتی اطراف مغز می توانند درگیر شوند و موجب انسداد راه های تنفسی، درگیری مغز، درگیری خون و حتی مرگ شود. در صورت بروز آبسه ی دندان در اولین فرصت باید به دندانپزشک مراجعه نموده و از مصرف سرخود آنتی بیوتیک خودداری کرد، چرا که مصرف نابجای

آنتی بیوتیک ها باعث پنهان شدن علائم یا مقاوم شدن میکروب ها می گردد. لازم به ذکر است که سرعت پیشرفت آبسه در بیمارانی که مشکل زمینه ای مثل اعتیاد به مواد مخدر، دیابت، و... داشته باشند بیشتر است، بنابراین این گونه افراد باید هر چه سریعتر به پزشک مراجعه نمایند.

علائم

- تب بالا و بی حالی که اولین علامت آبسه ی خطرناک است.
- درد شدیدی که ناگهانی شروع می شود و طی چند ساعت تشدید می شود.
- دردناک بودن ناحیه ی آسیب دیده در هنگام لمس
- افزایش حساسیت به غذاها و نوشیدنی های سرد و گرم
- وجود مزه و بوی بد دهان
- تورم و قرمز رنگ شدن لثه ی اطراف دندان
- آزاد شدن چرک به داخل دندان
- سست شدن دندان مبتلا
- ناراحتی عمومی و ناخوشی

درمان

درمان اصلی آبسه ی دندانی، حذف عامل عفونت است که این عمل به صورت باز کردن راهی جهت خروج چرک مثل بریدن بافت روی آبسه - عصب کشی و یا حتی خارج کردن دندان عامل عفونت انجام می شود و جهت تکمیل درمان فوق، آنتی بیوتیک های لازم نیز تجویز می شود.

موارد بستری در بیمارستان

۱. درگیری فضای اطراف حلق و مجاری تنفسی

۲. تب بالا و بی حالی

۳. دشواری در بلعیدن غذا و حتی آب

۴. دشواری در نفس کشیدن

۵. کاهش میزان باز شدن دهان

۶. تورم در صورت (اطراف چشم، گونه، زیر فک پایین، زیر چانه، زیر زبان)

در صورت بروز علائم ذکر شده، بیمار باید در بیمارستان بستری شود و ضمن دریافت آنتی بیوتیک به صورت وریدی، آبسه و چرک با عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی در اتاق عمل تخلیه شود.

مراقبت قبل از عمل

✓ پرهیز از خوردن و آشامیدن از ۸ ساعت قبل از عمل

✓ مصرف مسکن به دستور پزشک

✓ استفاده از دهانشویه و مسواک نرم و

رعایت بهداشت دهان

✓ اطلاع به پزشک در صورت داشتن

بیماری خاص یا مصرف دارو

✓ پاک کردن آرایش و لاک

✓ اصلاح صورت آقایان

✓ خارج سازی زیورآلات و دندان مصنوعی

✓ اخذ سی تی اسکن، آزمایش خون و

فوتو اسلاید

اخذ مشاوره ی بیهوشی و مشاوره های مورد

نیاز طبق دستور پزشک

مراقبت بعد از عمل

▪ ناشتا بودن ۴ تا ۵ ساعت بعد از عمل، سپس نوشیدن آب و در صورت تحمل، رژیم

مایعات پرپروتئین و پرکالری

▪ خوابیدن رو به بالا و بالا نگهداشتن سر

نسبت به تنه، پرهیز از فعالیت سنگین

▪ استفاده از کمپرس گرم با صلاح دید

پزشک معالج

▪ مصرف آنتی بیوتیک، مسکن، ضدالتهاب

طبق دستور پزشک

▪ استفاده از دهانشویه و مسواک نرم و

رعایت بهداشت دهان

در صورت داشتن درن، شست و شوی محل

درن با سرم شست و شو انجام شود.