


## علائم شکستگی گونه

- فرورفتگی ناحیه شکستگی در لمس در مقایسه ی قسمت مقابل
- فرورفتگی و عدم تقارن نسبت به سمت مقابل که پس از، از بین رفتن تورم مشهود خواهد شد
- معمولاً شکستگی گونه با کبودی زیر چشم ، خونریزی زیر عنیبه چشم ، تاری دید یا دو بینی و یا وجود خون در چشم مبتلا همراه است.
- در صورتیکه استخوان کف چشم درگیر شده باشد، احتمال فرورفتگی چشم به داخل و عدم تقارن نسبت به چشم مقابل وجود دارد.
- احتمال احتقان بینی که به علت خونریزی داخل سینوس وجود دارد.
- ممکن است عدم جفت شدن دقیق و کامل دندان ها به همراه داشته باشد.

## شکستگی استخوان گونه

شکستگی این ناحیه صورت به علت نازک بودن نسبی ناحیه قوس گونه و برجسته بودن آن در نزاع و تصادفات رانندگی میباشد.

باید دقت کرد که اگر فرد بعد از مدت طولانی تصمیم به جراحی بگیرد عمل جراحی به مراتب مشکل تر خواهد شد، بنابراین بهتر است در مواردی که جابجایی استخوان شکسته زیاد است قبل از جوش خوردن کامل عمل جراحی انجام شود.



بیمارستان آیت... طالقانی

## شکستگی استخوان گونه

شماره سند: PF-JW-10

نوبت بازنگری: اول

تاریخ ابلاغ: ۹۸/۰۸/۲۵



## مراقبت های بعد از عمل

- ❖ پرهیز از خوابیدن روی سمت مبتلا
- ❖ بالا بودن سر تخت هنگام خواب
- ❖ ناشتا بودن ۴ تا ۵ ساعت بعد از عمل، سپس نوشیدن آب و در صورت تحمل مصرف مایعات تا ۲۴ ساعت اول
- ❖ رعایت رژیم غذایی نرم و پرپروتئین و پرکالری تا ۱ هفته سپس رژیم معمولی
- ❖ استفاده از کمپرس سرد به مدت ۲۴ ساعت
- ❖ پرهیز از مصرف دخانیات تا دو هفته
- ❖ پرهیز از عطسه کردن شدید با بینی
- ❖ مصرف داروهای آنتی بیوتیک، مسکن، قطره بینی و قطره چشم به دستور پزشک
- ❖ استفاده از یادآور صورت ترجیحا به مدت ۱ تا ۲ هفته

## مراقبت های قبل از عمل

- ❖ رعایت رژیم غذایی نرم
- ❖ پرهیز از خوردن و آشامیدن از ۸ ساعت قبل از عمل
- ❖ اطلاع به پزشک در صورت داشتن بیماری خاص یا مصرف دارو
- ❖ پاک کردن آرایش و لاک
- ❖ اصلاح صورت آقایان
- ❖ خارج سازی زیورآلات و دندان مصنوعی
- ❖ اخذ سی تی اسکن، آزمایش خون و فوتو اسلاید
- ❖ اخذ مشاوره ی بیهوشی و مشاوره های مورد نیاز طبق دستور پزشک

در مواردی که فقط ناحیه قوس گونه شکسته باشد و خود استخوان گونه جابجا نشده باشد، می توان استخوان قوس گونه را با بی حسی موضعی و با یک برش کوچک از داخل دهان سر جایش بازگرداند و نیاز به اقدام دیگری نیست.

گاهی به دلیل جا به جایی زیاد ممکن است، برش کوچکی در ناحیه ی زیر ابرو یا زیر پلک داده شود، که جای زخم آن باقی نمی ماند. ممکن است به صلاح دید پزشک، چشم ناحیه مبتلا با سوچور فراست بسته شود، که ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد چشم را باز می کنند .

