




### پلاتین چیست ؟

برای ثابت کردن شکستگی ها از وسایلی استفاده می گردد که یکی از این وسایل پلاتین می باشد، پلاتین تا زمانی که استخوان کاملا جوش بخورد روی آن قرار می گیرد بعد می توان آن را با صلاحدید پزشک خارج کرد . پلاتین چند تا پیچ دارد که وقتی شکستگی را جا می اندازیم آنها را روی استخوان شکسته قرار می دهیم و بعد ثابت می شود. پلاتین باید تا زمانی که استخوان کاملا جوش بخورد روی آن بماند. سه تا ۶ ماه طول می کشد تا اغلب شکستگی ها جوش بخورد.



### دلایل مهم در جوش خوردن شکستگی :

- ✓ محل شکستگی
- ✓ سن بیمار
- ✓ نداشتن بیماری از قبل
- ✓ تغذیه بیمار
- ✓ انجام ندادن فعالیت بیش از حد و سنگین

۳. عفونت استخوان: گاهی محل جراحی عفونت کرده که در این موارد میکروبها به سطح پلاتین چسبیده و تشکیل توده می دهند که باعث می شود آنتی بیوتیک به بدن نفوذ نداشته باشد در این صورت با تشخیص پزشک پلاتین از اندام عفونی شده خارج می شود.

۴. اگر پلاتین به کار رفته در محل شکستگی قطعات شکسته شده را محکم نگرفته باشد باید حتما آن را خارج کرد در این مواقع پزشک جراح برای بی حرکت کردن قطعات شکسته شده از پلاتین بیرونی استفاده می کند.



### مراقبت های بعد از عمل جراحی :

۱. تعویض پانسمان تا یک هفته بعد از عمل جراحی انجام شود.
۲. کشیدن بخیه ها حدود دو الی سه هفته بعد از عمل جراحی
۳. جلوگیری از عفونت ناحیه زخم و در صورت علائم - ترشحات چرکی - تورم - عفونت از جمله قرمزی حساسیت در لمس به پزشک مراجعه کنید. - تب مراجعه به پزشک طبق دستور
۴. بیمار می تواند حمام برود ولی آب تا بعد از
۵. کشیدن بخیه ها روی ناحیه جراحی شده نریزد . انجام سریعتر فیزیوتراپی طبق دستور پزشک
۶. داروهای خود را به صورت منظم و در ساعت تنظیم شده مصرف نمایید.



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.