





بیمارستان آیت الله طالقانی

شکاف کام و لب

شماره سند: PF-JW-09

نوبت بازنگری: اول

تاریخ ابلاغ: ۹۸/۰۸/۲۵



لب شکری یا لب شکافته یکی از نواقص زایشی بدن است که در این حالت بخشی از لب نوزاد باز می ماند و گوشت آن رشد کافی ندارد. حالت لب شکری ممکن است همزمان با شکاف کام رخ دهد.

در حالت کام شکافته، بخش های چپ و راست کام سخت، پیوستگی ندارند.

این بیماران به علت درگیری ساختارهای مختلف صورت نیاز به درمان گروهی و چند مرحله ای دارند. معمولاً این افراد از بدو تولد نیازمند درمان های تغذیه ای، روان شناسی، ارتودنسی، گفتار درمانی و جراحی هستند.

درمان

درمان های جراحی برای بازسازی شکاف شامل جراحی بازسازی و بستن لب در ۲ تا ۳ ماهگی، درمان شکاف کام نرم در ۱۶ تا ۱۸ ماهگی، درمان بازسازی کام سخت در ۵ تا ۶ سالگی، درمان شکاف ناحیه ی دندانی در ۹ تا ۱۲ سالگی و توام با درمان ارتودنسی می باشد.

این افراد معمولاً نیاز به درمان های مکمل جراحی زیبایی فک و جراحی بازسازی بینی نیز دارند که معمولاً پس از جراحی مرتبط با بازسازی شکاف انجام می شود.

علامت اصلی لب شکری وجود شکاف در لب بالایی نوزاد است که به راحتی و بلافاصله بعد از تولد قابل مشاهده و تشخیص است.

نوزادان مبتلا به لب شکری معمولاً مشکل خاصی با غذا خوردن و تغذیه ندارند اما اگر نوزاد علاوه بر لب شکری به شکاف کام نیز مبتلا باشد، ممکن است با مشکلات تغذیه ای مواجه شود.

مراقبت های قبل از عمل

- ✓ پرهیز از خوردن و آشامیدن از ۸ ساعت قبل از عمل
- ✓ استفاده از دهانشویه و مسواک نرم و رعایت بهداشت دهان
- ✓ اطلاع به پزشک در صورت داشتن بیماری خاص یا مصرف دارو
- ✓ پاک کردن آرایش و لاک
- ✓ اصلاح صورت برای آقایان
- ✓ خارج سازی زیورآلات و دندان مصنوعی
- ✓ اخذ سی تی اسکن ، آزمایش خون و فوتو اسلاید
- ✓ اخذ مشاوره ی بیهوشی و مشاوره های مورد نیاز طبق دستور پزشک



۴

مراقبت بعد از عمل

- ✓ ناشتا بودن ۴ تا ۵ ساعت بعد از عمل، سپس نوشیدن آب و در صورت تحمل، رژیم مایعات پر پروتئین و پر کالری در بزرگسالان
- ✓ تغذیه شیر خوار تا چند روز بعد از عمل باید بدون فشار به خط بخیه انجام شود، به این منظور از قطره چکان یا سرنگ با نوک پلاستیکی استفاده کرده و از کنار لب وارد دهان شود، در صورت نیاز از گاوآژ یا لوله بینی معده ای استفاده شود.
- ✓ بعد از هر بار تغذیه باید خط بخیه را تمیز نمود.
- ✓ ممکن است لایه باریکی از پماد آنتی بیوتیک جهت مالیدن به خط بخیه، پس از تمیز کردن آن ناحیه تجویز گردد.
- ✓ خوابیدن رو به بالا و بالا نگهداشتن سر نسبت به تنه، پرهیز از فعالیت سنگین

۵

- ✓ استفاده از کمپرس سرد تا ۲۴ ساعت اول
- ✓ مصرف آنتی بیوتیک، مسکن، ضدالتهاب طبق دستور پزشک
- ✓ استفاده از دهانشویه و مسواک نرم و رعایت بهداشت دهان
- ✓ جلوگیری از صدمه و فشار به محل عمل
- ✓ بهبودی کامل کام ۴ تا ۶ هفته طول میکشد و بخیه ها ۷ تا ۱۴ روز بعد کشیده می شوند.



۶